

Module et argument

A tout point M de coordonnées $(a;b)$ du plan complexe, on associe un nombre complexe noté z qui s'écrit $z = a + ib$. On définit le module et l'argument de ce complexe de la façon suivante :


- On appelle **module** d'un nombre complexe z la norme du vecteur \overrightarrow{OM} . Le module de z est noté $|z|$ et se calcule comme l'hypoténuse d'un triangle rectangle.
- On appelle **argument** d'un nombre complexe z **non nul** une mesure de l'angle orienté $\theta = (\vec{i}; \overrightarrow{OM})$. L'argument de z est noté $\arg(z)$.

Les premières formules

Exprimer $|z|$ en fonction de a et b .

Exprimer $\cos \theta$ en fonction de a et $|z|$, puis en fonction de a et b .

Exprimer $\sin \theta$ en fonction de b et $|z|$, puis en fonction de a et b .



Remarque

Si la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe correspondent aux « coordonnées cartésiennes » d'un point du plan complexe, le module et l'argument correspondent aux « coordonnées polaires » de ce même point.


Exprimer le module à l'aide du conjugué

Soit $z = a + ib$ la forme algébrique d'un nombre complexe. Ecrire en fonction de a et b le produit $z \times \bar{z}$. En déduire une expression du module $|z|$ en fonction de z et \bar{z} .

Calculer le module des nombres complexes $z = 2 + i$, $z = 3 - 4i$ et $z = 3i$.

Déterminer un module et un argument

1. Déterminer la forme algébrique des affixes z_A, z_B, z_C, z_D, z_E et z_F .
2. Déterminer les modules de z_A, z_B, z_C, z_D, z_E et z_F .
3. Déterminer les arguments de z_A, z_B, z_C, z_D, z_E et z_F .




Déterminer le module et un argument d'un point image

On a placé dans le plan complexe ci-contre les points A, B, C, D et E.

On note z_A, z_B, z_C, z_D et z_E les affixes des cinq points.

1. Déterminer les modules de z_A, z_B, z_C, z_D et z_E .
2. Déterminer les arguments de z_A, z_B, z_C, z_D et z_E .
3. Donner la forme algébrique des complexes z_A, z_B, z_C, z_D et z_E .



4. Placer le point F d'affixe z_F qui vérifie $|z_F| = 4$ et $\arg(z_F) = \frac{\pi}{2}$.

Placer le point G d'affixe z_G qui vérifie $|z_G| = \sqrt{2}$ et $\arg(z_G) = -\frac{3\pi}{4}$.

Les propriétés du module

Soit z un nombre complexe. Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes. Soit n un entier relatif.


$$|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0 \qquad |z|^2 = z \times \bar{z} \qquad |z| = |-z| = |\bar{z}| = |-\bar{z}|$$

$$|z_1 \times z_2| = |z_1| \times |z_2| \qquad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \text{ si } z_2 \neq 0 \qquad |z^n| = |z|^n \text{ si } z \neq 0 \qquad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

En écrivant $z = x + iy$, démontrer les trois premières propriétés. En écrivant $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$, démontrer les deux propriétés suivantes. En procédant par disjonction de cas (n entier naturel puis n entier relatif négatif) démontrer la sixième propriété. Pour la septième propriété appelée « inégalité triangulaire », suivre les indications proposées ci-après : montrer que $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\text{Re}(z_1 \times \bar{z}_2) + |z_2|^2$, montrer que pour tout z complexe $\text{Re}(z) \leq |z|$, en déduire que $|z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$ puis conclure. Dans quel cas a-t-on $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$?

Un point d'étape sur les formules trigonométriques

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On considère le cercle trigonométrique de rayon 1. Les points A et B sont deux points de ce cercle tels que les mesures des angles orientés $(\vec{u}; \overrightarrow{OA})$ et $(\vec{u}; \overrightarrow{OB})$ soient respectivement a et b .



On a donc $\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} \cos(a) \\ \sin(a) \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} \cos(b) \\ \sin(b) \end{pmatrix}$.

Calculer de deux manière le produit scalaire $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ et en déduire la relation suivante : $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$

A l'aide des deux relations trigonométriques $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$, déduire de la relation précédente la relation suivante : $\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$.

A l'aide des deux relations trigonométriques $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$, déduire des deux relations précédentes les deux relations suivantes : $\sin(a - b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$ et $\sin(a + b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$.

A l'aide des quatre relations précédentes appelées « formules d'addition », démontrer les quatre « formules de duplication » proposées ci-dessous :

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$$

$$\sin(2a) = 2 \sin(a)\cos(a)$$

$$\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$$

$$\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Les premières propriétés de l'argument

Soit z un nombre complexe. Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes. Soit n un entier relatif.

z est un réel pur si et seulement si $\arg(z) \equiv 0[\pi]$

z est un imaginaire pur si et seulement si $\arg(z) \equiv \pi/2[\pi]$

$$\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z)[2\pi]$$

$$\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi[2\pi]$$

$$\arg(-\bar{z}) \equiv -\arg(z) + \pi[2\pi]$$

A l'aide de considérations d'ordre géométriques et graphiques dans le plan complexe, expliciter le sens et vérifier la validité des cinq affirmations proposées ci-dessus.

La forme trigonométrique d'un nombre complexe

A tout point M de coordonnées $(a;b)$ du plan complexe, on associe un nombre complexe noté z qui s'écrit $z = a + ib$. Supposons z **non nul**. Notons $r = |z|$ le module de z . Notons $\theta = \arg(z)$ un argument de z . La forme trigonométrique de z est : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. Justifier la validité et cohérence de cette forme en la confrontant à la forme algébrique $z = a + ib$.

Les autres propriétés de l'argument

On considère $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ un complexe non nul écrit sous la forme trigonométrique. On considère également $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ et $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ deux complexes non nuls écrits sous la forme trigonométrique. On considère également n un entier relatif.

1. Ecrire le produit $z_1 \times z_2$ sous la forme trigonométrique.
2. Quel est le module de z_1 ? Quel est le module de z_2 ? Quel est le module de $z_1 \times z_2$?
3. En déduire une relation entre $|z_1|$, $|z_2|$ et $|z_1 \times z_2|$.
4. Quel est un argument de z_1 ? Un argument de z_2 ? Un argument de $z_1 \times z_2$?
5. En déduire une relation entre $\arg(z_1)$, $\arg(z_2)$ et $\arg(z_1 \times z_2)$.
6. Grâce à la relation démontrée au point 5, écrire de deux manières $\arg\left(z \times \frac{1}{z}\right)$ et en déduire une relation entre $\arg\left(\frac{1}{z}\right)$ et $\arg(z)$.
7. Déterminer enfin une relation entre $\arg(z_1)$, $\arg(z_2)$ et $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$.
8. Grâce à la relation démontrée au point 5 et celle démontrée au point 6, établir en raisonnant par disjonction de cas (cas où n est un entier naturel positif puis cas où n est un entier relatif négatif) une relation entre $\arg(z^n)$, l'entier n et $\arg(z)$.

Quatre relations pour résumer le travail effectué

$$\arg(z_1 \times z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$$

$$\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z) [2\pi]$$


$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$$

$$\arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi]$$

Interprétation géométrique du module et de l'argument d'une différence

A et B deux points du plan complexe d'affixes z_A et z_B . C et D deux points du plan complexe d'affixes z_C et z_D . Rappelez ce que représentent les différences $z_B - z_A$ et $z_D - z_C$.

1. Quelle interprétation géométrique peut-on donner à $|z_B - z_A|$ et à $|z_D - z_C|$?
2. Quelle interprétation géométrique peut-on donner à $\arg(z_B - z_A)$ et à $\arg(z_D - z_C)$?
3. En déduire une interprétation géométrique pour $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)$



Construction d'un carré

On considère les nombres complexes $z_1 = (1-i)(1+2i)$, $z_2 = \frac{2+6i}{3-i}$ et $z_3 = \frac{4i}{i-1}$.

M_1 , M_2 et M_3 désignent les points images dans le plan complexe.

1. Déterminer la forme algébrique des trois nombres complexes.
2. Placer M_1 , M_2 et M_3 dans le plan complexe.
3. Calculer $\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$. Calculer $\left| \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right|$ et $\arg\left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}\right)$.
4. En déduire que le triangle $M_1M_2M_3$ est rectangle isocèle.
5. Construire le point M_4 tel que $M_1M_2M_4M_3$ soit un carré et déterminer son affixe z_4 .

Une rotation – Une translation

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. Tracer les cercles de centre O et de rayons 1 et 2.
2. Placer les points A , B et D d'affixes respectives $z_A = \sqrt{3} + i$, $z_B = \sqrt{3} - i$ et $z_D = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Vous commencerez par déterminer les formes trigonométriques de ces trois nombres complexes

On considère la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et la translation T de vecteur \vec{i} .


- Déterminer les affixes $z_{A'}$ et $z_{B'}$ des points A' et B' images de A et B par la rotation R . Vous commencerez par déterminer les formes trigonométriques de ces complexes puis les formes algébriques. Déterminer l'affixe $z_{D'}$ du point D' image de D par la translation T . Vous commencerez par déterminer la forme algébrique de ce complexe puis la forme trigonométrique. Placer les points A' , B' et D' .
- Calculer $\frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_{D'}}$. Déterminer une mesure de l'angle orienté de vecteurs $(\overrightarrow{OD'}; \overrightarrow{B'A'})$.
En déduire que (OD') est la médiatrice du segment $[A'B']$.

Une spirale complexe

On définit, pour tout entier naturel n , les nombres complexes z par :
$$\begin{cases} z_0 = 16 \\ z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n \end{cases}$$
. On note

r_n le module du nombre complexe z_n , c'est-à-dire $r_n = |z_n|$. Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct d'origine O , on considère les points A_n d'affixes z_n .


- Calculer z_1 , z_2 et z_3 . Placer les points A_1 et A_2 sur le graphique. Ecrire le nombre $\frac{1+i}{2}$ sous forme trigonométrique. Démontrer que le triangle OA_0A_1 est rectangle en A_1 .
- Démontrer que la suite (r_n) est géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$. La suite (r_n) est-elle convergente ? Interpréter géométriquement ce résultat.
- On note $L_n = \sum_{k=0}^{n-1} A_k A_{k+1} = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n$. Démontrer que $A_n A_{n+1} = r_{n+1}$.
Exprimer L_n en fonction de n . Déterminer la limite éventuelle de la suite (L_n) .



Une spirale complexe, encore...

Pour tout entier naturel n , on note A_n le point d'affixe z_n défini par
$$\begin{cases} z_0 = 1 \\ z_{n+1} = \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right) z_n \end{cases}.$$
 On définit la suite (r_n) par $r_n = |z_n|$.

- Déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$.
- Montrer que la suite (r_n) est géométrique. Déterminer son premier terme, sa raison et l'expression du terme général.
- Que dire de la longueur OA_n lorsque n tend vers $+\infty$?
- Démontrer que le triangle OA_nA_{n+1} est rectangle en A_{n+1} .

**Cosinus et sinus de pi sur douze**


On considère les nombres complexes $z_0 = \sqrt{3} - i$ et $z_1 = (1+i)z_0$.

- Déterminer la forme trigonométrique de ces deux nombres complexes.
- En déduire la valeur exacte des lignes trigonométriques suivantes : $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Une spirale alternée

On considère pour $n \geq 1$ la suite (M_n) d'affixes $z_n = 2^n \left(\cos \left((-1)^n \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left((-1)^n \frac{\pi}{6} \right) \right)$.

Ecrire z_1 , z_2 et z_3 sous forme algébrique. Placer les points M_1 , M_2 , M_3 et M_4 puis tracer les segments $[M_1M_2]$, $[M_2M_3]$ et $[M_3M_4]$. Montrer que $M_nM_{n+1} = \sqrt{3} \times 2^n$. On note pour tout $n \geq 1$ $L_n = M_1M_2 + \dots + M_nM_{n+1}$. Montrer que $M_n = 2\sqrt{3}(2^n - 1)$. Déterminer le plus petit entier p tel que $L_p \geq 1000$.

**Cosinus et sinus de cinq pi sur douze**

On considère les nombres complexes $z_1 = 2(1+i)$ et $z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$.

- Déterminer la forme trigonométrique de ces deux nombres complexes.
- Déterminer la forme trigonométrique du quotient de ces deux nombres complexes.
- En déduire la valeur exacte des lignes trigonométriques $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

Forme exponentielle d'un nombre complexe

Nous savons désormais que tout nombre complexe non nul peut s'écrire sous la **forme trigonométrique** $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ où r est le module et θ un argument de z . Posons $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. L'écriture de z sous **forme exponentielle** est alors $z = re^{i\theta}$.

Application directe

Ecrire les nombres complexes sous forme exponentielle. Détailler les étapes du raisonnement.

$$z_1 = 4\sqrt{3} + 4i \quad z_2 = 1 + i\sqrt{3} \quad z_3 = -\frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5i}{2} \quad z_4 = 2 - 2i \quad z_5 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$$

Pertinence de la notation

Soient $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$ deux complexes non nuls notés sous forme exponentielle. En utilisant les propriétés établies dans le cours sur la fonction exponentielle :

1. Calculer $z \times z'$ sous forme exponentielle.
Que devient le module du produit ? Que devient un argument du produit ?
2. Calculer $\frac{1}{z}$ sous forme exponentielle.
Que devient le module de l'inverse ? Que devient un argument de l'inverse ?
3. Calculer $\frac{z'}{z}$, sous forme exponentielle.
Que devient le module du quotient ? Que devient un argument du quotient ?
4. Cette nouvelle notation respecte-t-elle les propriétés sur le module et l'argument ?

Les formules d'Euler

Pour tout nombre réel θ non nul on définit $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Que peut-on dire de $e^{-i\theta}$? Exprimer $\cos(\theta)$ en fonction de $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$. Exprimer $\sin(\theta)$ en fonction de $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$. Ces deux expressions sont appelées les formules d'Euler. En utilisant les expressions du cosinus et du sinus ainsi établies, retrouver la relation fondamentale $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. En utilisant l'expression du cosinus ainsi établie, établir la relation $1 + e^{2i\theta} = 2 \cos(\theta) e^{i\theta}$.

La formule de Moivre

Pour tout nombre réel θ et tout entier naturel n on a la relation suivante $[\cos(\theta) + i \sin(\theta)]^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ qui est une autre façon d'exprimer $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

Nous nous proposons d'en démontrer la validité. La relation est-elle vraie pour $n=0$? Pour $n=1$? Pour $n=2$? En supposant que la relation soit vraie à un rang p quelconque, démontrer qu'elle est aussi vraie au rang suivant $p+1$. Que peut-on en conclure ?

Utilisation de la forme exponentielle

- En utilisant la formule d'Euler relative au cosinus, exprimer $\cos^2(x)$ en fonction de $\cos(2x)$ et retrouver la formule de duplication du cosinus. En utilisant les deux formules d'Euler, exprimer $\sin(2x)$ en fonction de $\cos(x)$ et de $\sin(x)$ et retrouver la formule de duplication du sinus.
- En utilisant les deux formules d'Euler, exprimer les quantités suivantes en fonction de $\cos(x)$ ou de $\sin(x)$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$$

- En factorisant par $e^{\frac{\theta}{2}}$ déterminer le module et un argument de $a=1+e^{i\theta}$ et de $b=1-e^{i\theta}$. Montrer que le quotient $\frac{a}{b}$ est un nombre imaginaire pur.
- Ecrire le nombre complexe $z=1+i\sqrt{3}$ sous forme exponentielle puis en déduire la forme algébrique des trois nombres complexes $a=(1+i\sqrt{3})^5$, $b=(1+i\sqrt{3})^5+(1-i\sqrt{3})^5$ et $c=(1+i\sqrt{3})^5-(1-i\sqrt{3})^5$.

Une situation géométrique

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. On note i le nombre complexe tel que $i^2 = -1$. On considère le point A d'affixe $z_A = 1$ et le point B d'affixe $z_B = i$. À tout point M d'affixe $z_M = x + iy$, avec x et y deux réels tels que $y \neq 0$, on associe le point M' d'affixe $z_{M'} = -iz_M$. On désigne par I le milieu du segment [AM].

Le but de l'exercice est de montrer que, pour tout point M n'appartenant pas à (OA), la médiane (OI) du triangle OAM est aussi une hauteur du triangle OBM' (propriété 1) et que $BM' = 2OI$ (propriété 2).

1. Dans cette question, on prend $z_M = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$. Déterminer la forme algébrique de z_M . Montrer que $z_{M'} = -3 - i$. Déterminer le module et un argument de $z_{M'}$. Placer les points A, B, M, M' et I dans le repère en prenant 2 cm pour unité graphique. Tracer la droite (OI) et vérifier rapidement les propriétés 1 et 2 à l'aide du graphique.
2. On revient au cas général en prenant $z_M = x + iy$ avec $y \neq 0$. Déterminer l'affixe du point I en fonction de x et de y . Déterminer l'affixe du point M' en fonction de x et y . Écrire les coordonnées des points I, B et M'. Montrer que la droite (OI) est une hauteur du triangle OBM'. Montrer que $BM' = 2OI$.

Une série d'exercices

71 Déterminer la forme exponentielle des nombres complexes suivants.


a) z_1 de module $\sqrt{3}$ et d'argument $\frac{2\pi}{3}$

b) $z_2 = 5e^{i\frac{\pi}{6}} \times 4e^{i\frac{\pi}{3}}$ c) $z_3 = \frac{2e^{i\frac{\pi}{2}}}{4e^{i\pi}}$

72 Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants.

a) $z_1 = 4e^{i\frac{\pi}{3}}$ b) $z_2 = 3e^{-i\frac{\pi}{4}}$ c) $z_3 = 2e^{2i\pi}$ d) $z_4 = \sqrt{2}e^{i\pi}$

73 Sur la figure ci-contre, déterminer graphiquement la forme exponentielle des affixes des points A, B et C.



74 Dans un repère orthonormé, placer les points :

a) A d'affixe $e^{i\frac{\pi}{4}}$ b) B d'affixe $\frac{1}{2}e^{i\pi}$

c) C d'affixe $2e^{i\frac{2\pi}{3}}$ d) D d'affixe $5e^{i2\pi}$

75 On considère le nombre complexe $z = 4e^{i\frac{\pi}{4}}$. Déterminer la forme algébrique de z^6 .

76 On considère le nombre complexe $z = 5e^{i\frac{\pi}{3}}$. Montrer que z^{2019} est réel.

119 Différentes formes d'un nombre complexe

On considère les deux nombres complexes $z_1 = 5 - 5i$ et $z_2 = 3e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

1. Déterminer la forme trigonométrique, puis la forme exponentielle de z_1 .

2. Déterminer la forme algébrique de z_2 .

3. En déduire la forme algébrique et la forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$.

4. En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

5. Déterminer la forme algébrique de z_1^{400} .

123 Suites de nombres complexes



On considère la suite de nombres complexes définie par

$$z_0 = 1 \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \left(1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}\right)z_n.$$

On note A_n le point d'affixe z_n .

1. a) Déterminer la forme exponentielle de $1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}$.

b) En déduire la forme exponentielle de z_1 et de z_2 .

2. Montrer que pour tout entier naturel n , $z_n = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n e^{in\frac{\pi}{6}}$.

b) Pour quelle valeur de n les points O, A_0 et A_n sont-ils alignés ?

3. Pour tout entier naturel n , on pose $d_n = |z_{n+1} - z_n|$.

a) Interpréter géométriquement d_n .

b) Calculer d_0 .

c) Montrer que pour tout entier naturel n non nul,

$$z_{n+2} - z_{n+1} = \left(1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}\right)(z_{n+1} - z_n).$$


d) En déduire que la suite (d_n) est géométrique, et exprimer d_n en fonction de n .

4. a) Montrer que pour tout entier naturel,

$$|z_{n+1}|^2 = |z_n|^2 + d_n^2.$$

b) En déduire que pour tout entier naturel n , le triangle OA_nA_{n+1} est rectangle en A_n .

5. Expliquer comment construire, à la règle non graduée et au compas, le point A_5 sur la figure ci-dessous.



6. On veut déterminer le plus petit entier tel que $|z_n| > 10$.

a) Compléter le programme en Python suivant.

```
n=0
u=...
while...:
    n=...
    u=...
print(...)
```

b) Déterminer cet entier à l'aide de la calculatrice.

D'après Bac S 2016